

Relizema™ cream

CS Symptomatická léčba dermatitidy a erytému. Relizema™ cream je určen k léčbě svědivé a zarudlé pokožky ve spojení s různými typy dermatitidy včetně atopické a kontaktní dermatitidy. Díky svému ochrannému účinku pomáhá obnovovat a udržovat fyziologickou kožní bariéru. Jeho složení chrání a zvlhčuje kůži a má zklidňující účinky.

→ **Způsob použití:** V případě dermatitidy a/nebo erytému nanášejte Relizema™ cream na postižené místo dle potřeby dvakrát nebo třikrát denně. Zdravotnický prostředek.

→ **Upozornění:** Pouze pro zevní použití. Pokud současně podstupujete jinou léčbu, informujte svého lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po každém použití obal pevně uzavřete. Nepoužívejte přípravek v případě porušeného obalu. Doba použitelnosti platí pro výrobek, který je skladován odpovídajícím způsobem a jehož obal je nepoškozený. Po uplynutí 90 dní od otevření by se přípravek neměl používat. Po použití zlikvidujte balení odpovídajícím způsobem. Nepoužívejte výrobek v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Pokud problémy přetrvávají i po 30 dnech používání, navštivte lékaře.

→ **Preventivní opatření:** Vyhýbejte se kontaktu s očima a sliznicí. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. Ukládejte výrobek mimo přímý dosah zdrojů tepla.

→ **Kontraindikace/Nežádoucí účinky:** Studie biokompatibility neuvádí žádné kontraindikace nebo nežádoucí účinky. Pokud se však projevívá, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

→ **Obsah:** Tuba o objemu 40 ml nebo 100 ml nebo sáček nebo tuba se vzorkem o obsahu 2 ml.








Dermatologicky testováno.

Neobsahuje parabeny ani parfemaci.

Pouze pro zevní použití.

Zabraňte styku s očima a sliznicí.

Při zasažení očí okamžitě oči vypláchněte velkým množstvím vody.

	Šarže / Šarža
	Doba použitelnosti / Dátum spotřeby
	Notifikovaná osoba 0476 / Notifikovaný orgán 0476
	Skladujte při teplotě do 30 °C / Skladujte pri teplote do 30 °C
	Před použitím si přečtěte návod k použití / Pred použitím si prečítajte leták
	Výrobce / Výrobca
	Datum výroby / Dátum výroby



Relizema™ cream

SK Symptomatická liečba dermatitídy a erytému. Relizema™ cream je určený na liečbu svrbenia a začervenania spojeného s rôznymi typmi dermatitídy vrátane atopickkej a kontaktnej dermatitídy. Vďaka svojmu ochrannému účinku na pokožku pomáha udržiavať a obnovovať fyziologickú kožnú bariéru. Jeho zloženie chráni a zvlhčuje kožu a má upokojujúci účinok.

→ **Spôsob použitia:** V prípade dermatitídy a/alebo erytému naneste Relizema™ cream na postihnuté miesto podľa potreby dvakrát až trikrát denne. Zdravotnícka pomôcka.

→ **Upozornenia:** Len na lokálne použitie. Ak súčasne podstupujete aj inú liečbu, konzultujte použitie s lekárom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po každom použití obal dôkladne uzatvorte. Ak je obal poškodený, prípravok nepoužívajte. Čas použiteľnosti sa vzťahuje na prípravok v neporušenom obale, ktorý bol správne skladovaný. Po uplynutí 90 dní od otvorenia sa prípravok už nemá používať. Obal po použití zlikvidujte zodpovedajúcim spôsobom. Prípravok nepoužívajte pri precitlivencosti na niektorú z jeho zložiek. Ak problémy pretrvávajú aj po 30 dňoch používania, poraďte sa so svojím lekárom.

→ **Preventívne opatrenia:** Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicou. V prípade, že ku kontaktu dôjde, vypláchnite veľkým množstvom vody. Uchovávajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla.

→ **Kontraindikácie/Nežiaduce účinky:** Štúdie biokompatibility nepreukázali žiadne kontraindikácie ani nežiaduce účinky. Ak sa však objavia, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

→ **Obsah:** 40 ml alebo 100 ml tuba na predaj alebo 2 ml vzorka ako vrecko alebo tuba.

Dermatologicky testované.

Neobsahuje parabény ani parfémy.

Len na vonkajšie použitie.

Vyhýbajte sa kontaktu s očami a sliznicou, ak príde ku kontaktu, ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody.

SLOŽENÍ: VODA, HYDROGENOVANÝ POLYDECEN, ETHYLHEXYL-PALMITÁT, DIMETIKON, GLYCEROL, GLYCEROL-MONOSTEARÁT, MAKROGOL-5000-MONOSTEARÁT, CETYLSTEARYLALKOHOL, MAGNESIUM-STEARÁT, RICINOVÝ OLEJ, FENOXYETHANOL, ASKORBYL-PALMITÁT, DINATRIUM-EDETÁT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, FURFURYL-PALMITÁT, ETHYL-LINOLENÁT, TOKOFEROL-ACETÁT, NATRIUM-HYALURONÁT, ETHYL-OLEÁT, ETHYL-LINOLEÁT, PROPYL-GALLÁT, TOKOFEROL, ETHYL-PALMITÁT, ETYL-STEARÁT.

ZLOŽENIE: VODA, HYDROGENOVANÝ POLYDECÉN, ETLHEXYL-PALMITÁT, DIMETIKÓN, GLYCEROL, GLYCEROL-MONOSTEARÁT, PEG-100 STEARÁT, CETOSTEARYL ALKOHOL, STEARÁT HOREČNATÝ, RICINOVÝ OLEJ, FENOXYETANOL, ASKORBYL-PALMITÁT, DINATRIUM-EDETÁT, ETLHEXYLGLYCERIN, FURFURYL-PALMITÁT, ETL-LINOLENÁT, TOKOFEROL-ACETÁT, HYALURONÁT SODNÝ, ETL-OLEÁT, ETL-LINOLEÁT, PROPYL-GALÁT, TOKOFEROL, ETL-PALMITÁT, ETL-STEARÁT.



0476



RELIFE S.r.l., Via dei Sette Santi 3, 50131 Florencie/Florenca, Itálie/Taliansko

www.relifecompany.com

Distributor pro CZ: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

Distribútor pre SK: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika